Helicobacter u psów: objawy, diagnoza i łagodne leczenie

Vetura | Dr. Ilse Erti • Ostatnia aktualizacja: 19 października 2026





Dr. Ilse Erti

Artykuł ten powstał we współpracy z lekarką weterynarii dr Ilse Erti. Od 20 lat prowadzi ona własną praktykę weterynaryjną specjalizującą się w małych zwierzętach w pobliżu Monachium i chętnie dzieli się swoją wiedzą z zaintereswanymi właścicielami psów.

Udostępnij wpis:

Gdy pies cierpi na nawracające wymioty, może to być sygnał, że coś dzieje się z jego żołądkiem. Jednym z częstych powodów jest zakażenie bakterią *Helicobacter*. Ta mała, spiralna bakteria potrafi przetrwać w kwaśnym środowisku żołądka i wywołać przewlekłe zapalenie błony śluzowej. Dobra wiadomość? Przy odpowiednim podejściu można skutecznie wyeliminować zakażenie i przywrócić psu komfort trawienia.

W tym artykule dowiesz się, jak rozpoznać, zdiagnozować i leczyć zakażenie bakterią Helicobacter u psów.

Spis treści

Chcesz przeczytać ten artykuł później? Pobierz artykuł w formacie PDF

Czym jest Helicobacter u psów?

Rodzaj *Helicobacter* obejmuje kilka bakterii o kształcie spirali, które mogą zasiedlać przewód pokarmowy zwierząt. W praktyce u psów obserwuje przede wszystkim *Helicobacter heilmannii*. *H. felis*, *H. bizzozeronii* oraz tak zwane *Organizmy podobne do Helicobacter w żołądku (GHLO)*.

Bakterie te osadzają się przede wszystkim na błonie śluzowej żołądka i przetrwają tam dzięki enzymowi ureazie, który miejscowo neutralizuje kwas żołądkowy. Wiele psów przez lata nosicielami tych drobnoustrojów, nie wykazując żadnych objawów. Jednak u zwierząt wrażliwych kolonizacja ta może wywołać zapalenie błony śluzowej żołądka – zazwyczaj objawiające się nudnością, wymioty lub złe samopoczucie po jedzeniu.

Z mojego doświadczenia wynika, że objawy te często przypominają inne schorzenia przewodu pokarmowego, na przykład nietolerancja pasożyta, problemach z wątrobą, reakcjach na stres lub prostoczasie zapalenie żołądka. Dlatego tak ważna jest precyzyjna diagnoza, która pozwoli z całą pewnością ustalić rzeczywistą przyczynę i zastosować ukierunkowane leczenie.

Objawy: Jak objawia się zakażenie bakterią Helicobacter u psów?

Zakażenie bakteriami z rodzaju Helicobacter dotyka przede wszystkim żołądek. U wielu psów objawy są chorzy wydają się początkowo niespecyficzne i łatwo można je pomylić z innymi schorzeniami.

Typowe objawy to:

- **Wymioty na czczo**, często rano i zazwyczaj żółte lub spienione
- **Nudności** z miankierem, ziewaniem, zawianiem lub jedzeniem trawy
- **Zmiany w apetycie** – raz brak apetytu, raz wilczy apetyt
- **Głośne bulgotanie w brzuchu**, zwłaszcza po posiłku
- **Niespokój lub niechęć do pokarmu**, gdy zdążałeś jest podrażniony
- **Powracający się też brzuszka** lub nagłe kopnięcia brzucha
- **Powolne odchudzanie**, jeśli dolegliwości utrzymują się dłużej

Objawy te pojawiają się, ponieważ *Helicobacter* spp. podrażnia błonę śluzową żołądka, a tym samym zakłóca proces trawienia. Zwłaszcza wymioty na czczo są często oznaką tego. Ze żołądek w nocy wytwarza dość dużą kwasu lub jest podrażniona.

Kiedy objawy mogą wskazywać na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka?

Jeśli dolegliwości utrzymują się przez dłuższy czas, może dojść do przewlekłej zapalenie błony śluzowej żołądka co wiąże się tym krok. W tym przypadku błona śluzowa żołądka jest w stanie przewlekłego zapalenia i wrażliwe reaguje na pokarm, stres lub kwas żołądkowy.

Stajesz się to szczególnie widoczne, gdy:

- objawy powracają przez tygodnie lub miesiące.
- pies regularnie wymiotuje rano.
- Nudności pojawiają się wielokrotnie, często bez wyraźnego powodu.
- zwierzę je niechętnie lub w niektórych okresach w ogóle nie je.
- Przełykanie, mlaskanie lub inne jedzenie trawy występuje częściej.
- pies wykazuje naprzemienne okresy „silku dobrych dni" i „złych dni".

Ten przebieg choroby wyjątkowo, gdy podrażniona błona śluzowa żołądka nie jest w stanie się zregenerować. Jeśli choroba pozostaje nieleczona, może wzrosnąć ryzyko wystąpienia wrzodów żołądka, przewlekłych stanów zapalnych lub silniejszych bólów. Dlatego też wskazane jest przeprowadzenie dokładnej diagnostyki, gdy tylko objawy zaczną regularnie powracać.

Czy bakteria Helicobacter u psów jest zakaźna?

Wiosł psie może *Helicobacter* można to przenieść w kontakt, jednak w codziennym życiu rzadko ma to duże znaczenie. Gatunki występujące u psów – takie jak *H. heilmannii* lub *GHLO* – znacznie różnią się od *Helicobacter pylori* u ludzi. Bezpośrednie przenoszenie chorobę na ludzi szmaje się zatem za mało prawdopodobne. Niemniej jednak warto stosować odpowiednie środki higieny, dbać o czystość misek i regularnie myć ręce, zwłaszcza jeśli pies często wymiotuje lub dochodzi do kontaktu ze śliną.

Leczenie: Jak leczyć zakażenie bakterią Helicobacter u psów

Leczenie zawsze zależy od nasilenia objawów i wyników badań diagnostycznych. Z reguły psy dobrze reagują na połączenie leków, łagodnej diety i starannego odciążenia przewodu pokarmowego. Mam celem jako lekarza weterynarii jest łagodzenie podrażnienia błony śluzowej żołądka, zmniejszenie liczby bakterii oraz jednoczesna stabilizacja przewodu pokarmowego.

Leczenie konwencjonalne

Standardowe leczenie weterynaryjne polega na tzw. terapii potrójnej. Zazwyczaj obejmuje ona:

- **dwa antybiotyki** w celu zmniejszenia liczby bakterii Helicobacter
- jeden **ochrona przed magiem** (inhibitory pompy protonowej lub blokery H_2) w celu złagodzenia podrażnienia błony śluzowej

połączone na określony czas.

Celem tego leczenia jest znaczne zmniejszenie kolonizacji bakteryjnej w żołądku oraz jednoczesne złagodzenie zapalenia błony śluzowej żołądka. U wielu psów już po kilku dniach obserwuje się wyraźną poprawę, jednak konieczne jest kontynuowanie terapii przez całą zalecaną okres, aby podrażnienie wyleczyć się trwale.

Ponadto często zalecam moim pacjentom, aby stres, unikać gwałtownych zmian karmy i trudno strawnych smakołyków, ponieważ mogą one dodatkowo obciążać przewód pokarmowy. Po zakończeniu kuracji antybiotykowej warto flora jelitowa ponownie zapewnić im ukierunkowane wsparcie, ponieważ taki mogą wpływać również na pozytywne bakterie.

Odżywianie i dieta oszczędna podczas leczenia

Dieta o łagodnym działaniu odciąża podrażniony przewód pokarmowy i wspomaga proces gojenia. Wiele psów odczuwa ulgę podczas terapii przeciwko Helicobacter dzięki tymczasowej diecie oszczędnej, która jest lekkostrawna i nie podrażnia żołądka.


Z mojego doświadczenia wynika, że sprawdziły się:

- **gotowany kurczak** lub indyk bez skóry
- **Ziemniaki lub ryż** jako dobrze przyswajalne źródło węglowodanów
- **twarożg** w niewielkich ilościach, o ile jest dobrze tolerowany
- **Siodki ziemniak czy dynia** na uspokojenie żołądka
- **małe, częste posiłki** zamiast dużych porcji

Z kolei mniej odpowiednie są pokarmy, które mogą podrażniać żołądek, na przykład:

- mocno przyprawione lub tłuste potrawy
- bardzo twarde produkty do żucia
- nagła zmiana pokarmu
- Karma zawierająca wiele dodatków

Wskazówka: W wielu przypadkach pomocne jest rozłożenie posiłków na cały dzień, aby żołądek nie pozostawał długo pusty – zwłaszcza u psów, które mają skłonność do wymiotów na czczo. Spokojna atmosfera podczas karmienia, bez stresu, dodatkowo wspomaga odciążenie układu pokarmowego.



Nasz Kompleks Probiotyczny dla Psa został opracowany w celu naturalnego wspomagania trawienia.

O produkcie →

W magazynie: w 3 dni robocze u siebie.

Naturalne wsparcie dzięki prebiotykom i probiotykom

Szczególnie w trakcie lub po kuracji przeciwko Helicobacter przewód pokarmowy wymaga dodatkowej troski. Antybiotyki mogą być co prawda konieczne, ale jednocześnie mają negatywny wpływ na florę jelitową. Wiele psów szybciej odzyskuje dobre samopoczucie, gdy trawienie jest wspomagane przez połączenie prebiotyków i probiotyków.

Prebiotyki służą jako „pokarm" dla dobrych bakterii w jelitach, natomiast probiotyki zawierają żywe mikroorganizmy, które mogą stabilizować równowagę w przewodzie pokarmowym. W praktyce szczególnie sprawdziło się łagodne, stopniowe wprowadzanie – zwłaszcza w przypadku psów podatnych na nudności, wymioty na czczo lub podrażnienie błony śluzowej żołądka.

Te cztery kroki pomogą Twojemu psu przywrócić równowagę flory jelitowej:

1. **Odpowiedni dobór paszy**: Łatwo przyswajalna, wysokiej jakości karma zapewnia żołądkowi spokój i stanowi dobrą podstawę.
2. **Suplementacja probiotykami**: Probiotyk opracowany specjalnie dla psów może wspierać naturalną różnorodność bakteryjną i stabilizować trawienie.
3. **Wprowadź prebiotyki**: Składniki takie jak łupiny nasion psyllium czy inulina sprzyjają rozwojowi „dobrych" bakterii jelitowych.
4. **Bądź na bieżąco**: Flora jelitowa potrzebuje trochę czasu, aby się zregenerować – ciągłym rozwiązaniem jest ciągłe wspomaganie jej przez kilka tygodni.

Wiele psów w tym okresie odnosi korzyści ze specjalnie dobranego połączenia szczepów bakterii probiotycznych i łagodnych błonnik. Ważne łagodzą żołądek i odciążają jelita.

Pasza uzupełniająca, taka jak **Mieszanka probiotyków Vetura** może zapewnić takie wsparcie. Zawiera probiotyki, prebiotyki oraz naturalne składniki roślinne, takie jak łupiny psyllium i koper włoski. Zawarty w nim szczep bakterii jest odporny na kwas żołądkowy, dzięki czemu niezawodnie dociera do jelit – co stanowi zaletę w przypadku psów, których błona śluzowa żołądka jest *Helicobacter* reaguje szczególnie wrażliwie.

Stosowanie: Ze pomocą dołączonej miarki możesz łatwo dodać mieszankę probiotyków do codziennej karmy swojego psa. Masz również możliwość wypróbowania preparatu bez ryzyka dzięki 60-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Zamówienia złożone w dni robocze przed godziną 15:00 są zwykle przetwarzane już następnego dnia – dzięki temu możesz od razu rozpocząć stosowanie preparatu.

Wiele psów dobrze toleruje ten proszek, ponieważ wystarczy go po prostu wymieszać z karmą. Na początek zaleca się podawać niewielką ilość, którą należy stopniowo zwiększać, aby układ pokarmowy mógł się bez problemów przystosować.

Kiedy należy zabrać psa do weterynarza?

Krótkotrwałe rozstrój żołądka może od czasu do czasu wystąpić u psów, jeśli jednak dolegliwości pojawiają się częściej lub towarzyszą im pewne sygnały ostrzegawcze, należy zabrać psa do weterynarza na badanie. Jest to szczególnie ważne, gdy:

- **wymioty powtarzają się**, zwłaszcza rano na czczo
- **Nudności, mlaskanie lub jedzenie trawy** trwa przez kilka dni
- twój pies **odmowa przyjęcia pokarmu** lub odczuwa silne wahania między głodem a brakiem apetytu
- **Utrata wagi**, do których mogą dołączyć osłabienie lub bole brzucha
- **Kow w wymiotach** lub jest widoczny w odchodach
- stan nie poprawia się pomimo stosowania diety oszczędzającej

Takie objawy mogą wskazywać na silniejsze podrażnienie błony śluzowej żołądka lub rozwój przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka. Wczesna diagnostyka pomaga uniknąć niepotrzebnego bólu i dobrać odpowiednie leczenie – zwłaszcza gdy w grę wchodzą bakterie z rodzaju Helicobacter.

Wniosek: Bakterię Helicobacter można skutecznie leczyć – ważne jest postawienie pewnej diagnozy

Zakażenia bakterią Helicobacter mogą powodować poważne zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego Twojego psa. ale w większości przypadków da się je bardzo skutecznie wyleczyć. Ważne jest, aby jak najwcześniej ustalić, czy to właśnie bakteria są przyczyną dolegliwości, czy też kryje się za nimi inna choroba. Dzięki odpowiedniej terapii, łagodnej diecie i odpowiedniemu wsparciu flory jelitowej Twój pies może odzyskanie wyrównać i znów cieszyć się spokojem w codziennym życiu. Życzę wam szybkiego powrotu do zdrowia!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące bakterii Helicobacter u psów

Jak diagnozuje się zakażenie bakterią Helicobacter u psów?

Jak niebezpieczna jest bakteria Helicobacter u psów?

Czy pies może wielokrotnie zarazić się bakterią Helicobacter?

Czy mój pies z zakażeniem Helicobacter może jeść normalnie?

Czy mogę leczyć mojego psa bez antybiotyków?

Tekstu na grafikach zostały przetłumaczone z języka niemieckiego z wykorzystaniem narzędzi AI, a następnie zredagowane i sprawdzone przez native speakera przy jak przekładzie. Treść merytoryczna pozostała niezmieniona.

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych wskazówek i zostały stworzone na podstawie dostępnych źródeł. Autorzy oraz operatorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za utratę materialne ani niematerialne powstałe w wyniku korzystania z przedstawionych informacji lub zaniechania działania na ich podstawie. Treści nie zastępują indywidualnej konsultacji z lekarzem weterynarii, który zna historię choroby i aktualny stan zdrowia konkretnego zwierzęcia. Przed podjęciem decyzji dotyczącej diety dla zwierząt lub podawaniem preparatów, w tym także z tych, które nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, łagodzenia ani zapobiegania chorobom, należy zasięgnąć również porady lekarza weterynarii. W razie wątpliwości przed zastosowaniem produktu należy zawsze skonsultować się z lekarzem weterynarii.