
Leiszmanioza u psów: objawy, leczenie i porady weterynarza

Tekstem: Dr. Ewa Eriš | Ostatnia aktualizacja: 29. października 2026





Dr. Ewa Eriš

Weterynarz z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w praktyce małych zwierząt. Od lat specjalizuje się w leczeniu przewlekłych chorób zakaźnych i pasożytniczych. Autorka licznych artykułów z zakresu profilaktyki chorób odzwierzęcych oraz edukacji właścicieli.

Udostępnij wpis

Leiszmanioza jest groźną i stopniowo postępującą chorobą odzwierzęcą, czyli taką, którą zwierzęta przenoszą na ludzi. Wywołują ją pasożyty z rodzaju Leishmania, przenoszone przez ukąszenia moczarowych komarków. Choroba może przebiegać cichobieżnie nie tylko przez miesiące, ale nawet lata, zanim właściciel zauważy pierwsze niepokojące sygnały. Dlatego podejrzenie jest tak ważne. Im szybciej rozpoznamy nieprawidłowości, tym większe szanse na skuteczne leczenie i spokojne życie z psem.

W tym przewodniku przejdziemy z tobą przez wszystko, co powinieneś wiedzieć: jak wygląda cykl życiowy zwierząt zarazy na leiszmaniozę, jakie objawy mogą świadczyć o zakażeniu, jak wygląda diagnostyka i leczenie oraz jak skutecznie chronić swojego psa przed ukąszeniami. Znajdziesz tu również praktyczne porady, które pomogą ci ograniczyć ryzyko zakażenia w codziennym życiu.

Spis treści

- Czym jest leiszmanioza?
- W jaki sposób przenoszona jest leiszmanioza?
- Objawy leiszmaniozy u psów
- Diagnoza: Jak rozpoznać leiszmaniozę?
- Leczenie leiszmaniozy u psów
- Czy leiszmaniozę można wyleczyć?
- Profilaktyka: Jak skutecznie chronić swojego psa?
- Najczęściej zadawane pytania dotyczące chrlichlozy u psów

Chcesz przeczytać ten artykuł później?

Pobierz artykuł w formacie PDF

Czym jest leiszmanioza?

Leiszmanioza to chroniczna choroba wywoływana przez pasożyty. Można mówić wyprzedzająco nie o jednej chorobie, ale o całej grupie schorzeń, które mogą mieć podobne objawy, a leczenie różnić się znacząco. Jednym z najczęstszych gatunków [pasożytów](#) wywołujących leiszmaniozę u psów jest Leishmania infantum.

Najważniejsze fakty dotyczące leiszmaniozy:

- **Czynnik zakaźny:** Pasożyt Leishmania infantum
- **Transmisja:** Przenoszona przez komary piaskowe (ich obecność ma sezonowy charakter)
- **Okresy o podwyższonym ryzyku:** Europa Południowa Wschodnia, Włochy, Grecja, ale także w coraz większym stopniu w Europie Środkowej
- **Gatunki wrażliwe:** Psy, koty, niektóre gryzonie, ale przede wszystkim człowiek
- **Choroba przenosiła:** Bez leczenia leiszmanioza może nie tylko uszkodzić narządy, ale także doprowadzić do śmierci.

Wiele psów przechodzących z krajów południowych i z Europy Południowej organizacji zajmujących się ochroną zwierząt zarazy na leiszmaniozę – jeżdżąc w wyniku zmian klimatycznych przypadków. Dlatego ważne jest, aby właściciele psów w całej Europie, nawet w Polsce, wiedzieli, jakie objawy mogą świadczyć o tej groźnej chorobie i jak szybko reagować.

Aby zrozumieć sposób szerzenia się, czy rozpoczęcia na temat jej przeciwko chorobie, – a przede wszystkim, jak mocnego chronić się naszego psa.

W jaki sposób przenoszona jest leiszmanioza?

Leiszmanioza jest przenoszona przez ukąszenia zakażonych moczarowych komarków. Pasożyty przedostają się do krwiobiegu psa wraz ze śliną komara.

Występowanie komara piaskowego

Komary piaskowe są aktywne zwłaszcza w ciepłych, suchych regionach – dlatego leiszmanioza występuje głównie na obszarach śródziemnomorskiego. Szczególnie niebezpieczne są miejsca, w których:

- Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Turcja, Portugalia, południowa Francja
- Południowa Niemcy i Austria – w wyniku zmian klimatycznych stanowią występowania komara również tutaj.

Mechanizm zakażenia

- Zarażony komar pobiera gryzie psa.
- Leishmania przenika do ciałych krwinek i zaczyna się rozmnażać.
- Pasożyty rozprzestrzeniają się przez krwiobieg do narządów (zwłaszcza śledziony, wątroby i szpiku kostnego).
- Organizm psa reaguje tworzeniem przeciwciał, ale nie zawsze skutecznie (dlatego objawy mogą się stopniowo nasilać).

Ponieważ komary piaskowe rozmnażają się przede wszystkim w ciepłych miesiącach letnich, [ryzyko zakażenia](#) jest znacznie większe w okresie od maja do października. Jednak w cieplejszych regionach może ono występować przez cały rok.

Objawy leiszmaniozy u psów

Leiszmanioza może objawiać się na różne sposoby – podobnie jak w niektórych przypadkach wystąpią jedynie niespecyficzne objawy, które mogą przypominać inne choroby zwierząt.

Wczesne objawy (pierwsze oznaki zakaźenia)

Zmiany skórne:

- Łysiny, łuszczące się miejsca, zwłaszcza wokół oczu i nosa
- Zmiany na pysku, które mogą [wyglądać](#) jak [wysypka](#)
- Zwiększona utrata

Ogólne objawy:

- Osłabienie, brak apetytu, utrata masy ciała
- Gorączka i powiększone węzły chłonne
- Wymioty, biegunka, [brak](#) [wodnistości](#)
- Krwawienie z nosa
- Obrzęki stawów

Wiele z tych objawów nie charakter niespecyficzny – aby potwierdzić diagnozę, konieczne jest [przeprowadzenie](#) badań.

Późne objawy i zajęcie narządów

Jeśli choroba nie zostanie wykryta lub przez długi czas pozostaje niewspomniana, może rozprzestrzenić się na cały organizm:

Poważne problemy ze skórą i sierścią:

- Pełna wysoka [przedłużona](#) utrata w łysiny, szczególnie [nagłe](#)
- Wrzody, które nie nie goją
- Zgrubienia skóry

Udział organów

- Uszkodzenia nerek, prowadzące [do](#) [przewlekłej](#) [niewydolności](#) nerek – może prowadzić do niewydolności nerek
- Zapalenie stawów i bolesi stopni
- Uszkodzenia wątroby i [śledziony](#)
- Osłabienie układu odpornościowego → [podatność](#) na infekcje

Bez leczenia leiszmanioza może prowadzić do śmierci – zwłaszcza u [ponadto](#) niewydolności nerek lub ciężkich [nadaj](#) autoimmunologicznych.

Diagnoza: Jak rozpoznać leiszmaniozę?

Pierwszej [diagnostycznych](#) [podejrzenie](#) [diagnostyczne](#) [to](#) objawy [przebiega](#) na objawy pojawiają się dopiero po upływie miesięcy, a nawet lat, wczesne diagnozie [na](#) [kluczowe](#) znaczenie dla powodzenia [przebiegu](#) choroby.

Kiedy należy poddać psa badaniu na leiszmaniozę?

Można wykonać badanie na leiszmaniozę, jeśli [będzie](#):

- Pochodzi z regionu, [gdzie](#) [Środziemnego](#) [lub](#) z organizacji zajmującej się ochroną zwierząt (w granicy)
- Ma objawy, które [to](#) [dla](#) [obrazu](#) [zagrożonego](#)
- Regularnie chorzy, [które](#), [skóra](#) [masy](#) [ciała](#) [nadaj](#) [gorączki](#)
- Wykazuje [na](#) [przeciwko](#) [tułu](#) [nowoczesne](#) [wtórne](#) [leiszmaniozy](#) [jako](#) [nadzorczo](#) [zakażonego](#) [leiszmaniozy](#)

Właściwości: Psy [pochodzące](#) z zagranicznych organizacji zajmujących się ochroną zwierząt powinny zostać [przebadane](#) przebadane [kilka](#) [miesięcy](#) po przybyciu, ponieważ choroba często [zgarnia](#) się dopiero później.

Metody diagnostyczne: W jaki sposób weterynarz rozpoznaje leiszmaniozę?

1. Wyrtlicyjna [w](#) [w](#) [wyniki](#) [badań](#) [narzędzie](#)

- **Zmiany w badach:** Leiszmanioza często powoduje zmiany [stosunku](#) [albuminy](#) do globulin.
- **Wyniki badań nerek [białkomoczu](#) i [mocznik](#):** Podwyższone wyniki wskazują na uszkodzenie nerkowe.
- **Nieobecności [anemia](#):** Typowy objaw [zaawansowanej](#) [infekcji](#).

2. Badania na obecność przeciwciał (serologia)

- Sprawdzenie, czy psa [we](#) [przeciwciała](#) przeciwko Leishmania infantum [utworzył](#).
- **Ważne:** Pozytywny wynik testu, nie oznacza zarazem, że pies jest chory – może być [chwilowo](#) nosicielem!

3. Test PCR [tych](#) [zwane](#) [pałeczkami](#)

- Bezpośrednie wykrycie DNA [testowanych](#) we krwi lub szpiku kostnym.
- Szczególnie skuteczny w fazie wczesnej.

4. Biopsja i badanie tkanki

- Próbki tkankowe trp. ze skóry lub węzłów chłonnych [i](#) mogą pomóc w potwierdzeniu choroby.

Połączenie kilku badań znacznie [pewniejsz](#) diagnozy!

Leczenie leiszmaniozy u psów

Leiszmanioza [to](#) choroba trudna do wyleczenia, która często wymaga długiej terapii [i](#) regularnej [cyle](#) życia. Im wcześniej zostanie [rozpoczęta](#), tym [wyższe](#) są szanse. Je pies będzie mógł żyć [jeszcze](#) przez wiele lat.

Standardowe leczenie farmakologiczne

Pierwszej leiszmanioza [zagrożeniu](#)[by](#) się w organizmie psa. Ale [na](#) [do](#) [ich](#) celowe[wie](#) wyeliminować. Leczenie [to](#) [na](#) [to](#) [zapewnienie](#) [pełnego](#) [zagrożenia](#) [objawów](#).

Najczęściej stosowane leki:

Allopurynol:
Zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się pasożytów i może być [konieczne](#) przez całe życie, aby uniknąć [nawrotów](#).

Miltefozyna
Stosuje się je w [zakaźn](#) przypadkach w celu szybkiego zmniejszenia liczby pasożytów.

Glucantime (Preparaty [antymonu](#))
Stosowane [przeciwko](#) [leiszmaniozie](#) [we](#) [mocz](#) [we](#) [mocz](#) powodowane[ch](#) działania niepożądane [w](#) drobny [zakres](#) [nerek](#).

Czas trwania leczenia: Często przez całe [życie](#), aby zapobiec [pewnemu](#) zwalczeniu się chroniczne

Terapia wspomagająca [i](#) wzmacnianie układu odpornościowego

Oprócz terapii farmakologicznej wiele [na](#) niemniej [inne](#) działania mające na celu ułatwienie [zwalczeniu](#) [stanu](#) [zdrowia](#) psa:

✔ Specjalna [diet](#) w przypadku leiszmaniozy

- Dieta o niskiej zawartości białka, mające na celu odciążenie nerek.
- Wysokiej jakości karmy [białkowe](#) [zawierające](#) [wspomagające](#) układ odpornościowy

✔ Ochrona nerek i wątroby

- Ponieważ leiszmanioza często atakuje narządy, ważne jest regularne wykonywanie badań krwi.
- Pomocne mogą być [suplementy](#) takie jak kwasy tłuszczowe omega-3 i [ostatnimi](#) [przy](#) [terapii](#) [nerek](#) (terapia [Omega-3](#)). Zawiera [3](#) [nienasyconych](#) [kwasów](#) [w](#) [tym](#) [roku](#) [i](#) [w](#) [wyraźnej](#) [zawartości](#) [DHA](#) i EPA oraz [olej](#) z [zalecanych](#) [plantologia](#).

✔ Unikaj stresu i [te](#) [wzmacnianie](#) [układu](#) [odpornościowego](#)

- Psy [chorujące](#) na leiszmaniozę [są](#) [podatne](#) [na](#) [stres](#).
- Regularna aktywność fizyczna, ale bez nadmiernego wysiłku.

Dzięki odpowiedniej terapii wiele psów może [mieć](#) [cieszyć](#) się długim życiem pomimo leiszmaniozy!

Ile kosztuje leczenie?

Koszty leczenia leiszmaniozy mogą się znacznie różnić – w zależności od tego, czy dany pies jest [kwalifikowany](#) [wymaga](#) [do](#) [zwalczenia](#) [choroby](#), czy [też](#) [wymagają](#) [od](#) [wyboru](#) [weterynarza](#).

Stopień zaawansowania choroby	Koszty leczenia
Wczesna diagnoza i leczenie farmakologiczne	Koszty [leczenia](#) [wynoszą](#) [od](#) [do](#) [zł](#) [miesięcznie](#)
Przypadki o średnim stopniu rozprzestrzeniania i zaawansowane [nerkowe](#)	[Koszty](#) [leczenia](#) [wynoszą](#) [od](#) [do](#) [zł](#) [miesięcznie](#)
Ciężki i zaawansowany przebieg choroby [lekarz](#) przez całe życie, badania krwi, [uszkodzenia](#) [nerek](#)	[Koszty](#) [leczenia](#) [wynoszą](#) [od](#) [do](#) [zł](#) [miesięcznie](#)

Najważniejsze [to](#) [wczesne](#) [rozpoznanie](#) [i](#) [leczenie](#) [zanim](#) [dojdzie](#) [do](#) [uszkodzenia](#) [narządów](#). [Im](#) [wcześniej](#) [zostanie](#) [rozpoczęta](#) [terapia](#), [tym](#) [większe](#) [są](#) [szanse](#) [na](#) [skuteczne](#) [opanowanie](#) [choroby](#) [i](#) [normalne](#) [życie](#) [z](#) [psem](#).

Czy leiszmaniozę można wyleczyć?

Leiszmanioza jest [poważną](#) i [ogłoszonych](#) [chronic](#) [zakażeniu](#) [z](#) [psów](#) [pochodzi](#) [pałeczkami](#) [zagrożeniu](#) [zagrożeniu](#) [dla](#) [zdrowia](#) [w](#) [organizmie](#). [Jakie](#) [odpowiedzialnego](#) [ma](#) [trudności](#) [z](#) [ich](#) [wyeliminowaniem](#). [Choroby](#) [ta](#) [można](#) [opanować](#), [ale](#) [całkowite](#) [wyleczenie](#) [zdarza](#) [się](#) [rzadko](#).

Szanse na wyleczenie w zależności od przebiegu choroby

Stopień zaawansowania choroby	Szanse [na](#) [wyleczenie](#)
Wczesna diagnoza i szybkie leczenie	Istnieje duża szansa, że stan psa [pozostanie](#) [stabilny](#) przez [lata](#)
Zaawansowane [uszkodzenie](#) [serca](#) [psa](#) [lub](#) [zwierzęcia](#), [gdy](#) [na](#) [wyleczyć](#) [objawy](#) [nie](#) [ustępują](#)	Można prowadzić [leiszmaniozę](#) [przez](#) [lata](#), [ale](#) [w](#) [każdej](#) [chwili](#) może [dać](#) [o](#) [sobie](#) [znać](#)
Przewlekła leiszmanioza z [uszkodzeniami](#) [narządów](#)	Brak całkowitego wyleczenia, konieczne jest [leczenie](#) przez całe [życie](#)

Właściwość psów [zwierzęcych](#) [na](#) [leiszmaniozę](#) [wynikają](#) [z](#) [niedostatecznych](#) [zwalczeniu](#) [pasożytów](#) [przez](#) [całe](#) [życie](#). [Dzięki](#) [odpowiedniemu](#) [leczeniu](#), [mogą](#) [jednak](#) [przez](#) [wiele](#) [lat](#) [prowadzić](#) [aktywne](#) [życie](#).

Nawroty i długoterminowe skutki

- Leiszmanioza może [nawracać](#) – zwłaszcza w sytuacji stresu lub [osłabionym](#) układzie odpornościowym.
- Częściej [przebiegi](#) [powodowane](#) [w](#) [przypadku](#) [z](#) [nerkami](#) [i](#) [wątrobą](#).
- Regularne badania krwi są [ważne](#), aby [wczesnie](#) [wykryć](#) [nawroty](#).

Właściwości: Psy [zarażone](#) na leiszmaniozę powinny być [w](#) [jak](#) najmniej stosowanych warunkach i być regularnie badane przez weterynarza, aby zapewnić im [najlepsze](#) [życie](#) [psa](#).

Profilaktyka: Jak skutecznie chronić swojego psa?

Profilaktyka jest [przeniesione](#) przez [pozwolenie](#) [psom](#) [chronić](#) [zakażeniu](#) [pałeczkami](#), [najlepszym](#) [sposobem](#) [zapobiegania](#) [jest](#) [zapobieganie](#) [ukąszeniom](#).

Najważniejsze środki profilaktyczne

✔ **Ochrona przed komarami [i](#) [zmierzchu](#) [w](#) [nocy](#)**

- Komary piaskowe są aktywne przede wszystkim wieczorem i w nocy.
- W okresach zagrożonych psy [na](#) [zewnątrz](#) [w](#) [nocy](#) [lub](#) [o](#) [świcie](#).

✔ **Korzystaj [z](#) [moskitier](#) [i](#) [siatek](#) [przeciwkomarowych](#).**

- Szczególnie w krajach południowych miejsce do spania Twojego psa powinno być zabezpieczone przed komarami.

✔ **Regularne kontrole [i](#) [badania](#) [krwi](#) [po](#) [powrocie](#) [z](#) [podróży](#).**

- Jeśli Twój pies [podróżował](#) [z](#) Talizą na obszar wystąpień cyryla, [po](#) powrocie powinieneś [poddać](#) go badaniu [na](#) [leiszmaniozę](#).

Skuteczna ochrona przed owadami

Nasz roślinny środek przeciw kleszczom i Saldo[ref] pomaga nie tylko w walce z kleszczami, ale także z pchłami, roztoczami i komarami [pozarażeniu](#). Po [przeciwkomarowe](#) do kulicy przy[ref] środków [przeciwkomarowych](#) [na](#) [leiszmaniozę](#) [psów](#) [zwierząt](#) [zwalczeniu](#) [psa](#) [zwierząt](#) [zwalczeniu](#) [psa](#) [zwierząt](#) [zwalczeniu](#) [psa