Roztocza grobowe u psów: objawy, leczenie i porady weterynarza

Vetura i Dr. Ilse Ertl • Ostatnia aktualizacja: 19. października 2026

Dr. Ilse Ertl

Artykuł ten powstał we współpracy z lekarką weterynarii dr Ilse Ertl. Od 20 lat prowadzi ona własną praktykę weterynaryjną specjalizującą się w małych zwierzętach w pobliżu Monachium i chętnie dzieli się swoją wiedzą z zainteresowanymi właścicielami psów.

Udostępnij wpis:

Jeśli Twój pies ciągle się drapie, wydaje się niespokojny i pojawiają się u niego łysiny w sierści, przyczyną mogą być roztocza kopiące (roztocza świerzbowe). Te maleńkie pasożyty wywołują tzw. świerzb Sarcoptes – wysoce zaraźliwą chorobę skóry, która jest nie tylko niezwykle nieprzyjemna dla psów, ale może również przenosić się na ludzi.

Dobra wiadomość: świerzb da się wyleczyć – pod warunkiem, że zostanie wcześnie wykryty i konsekwentnie leczony. W tym artykule dowiesz się, jak żyją roztocza, w jaki sposób Twój pies się zaraża, jakie są typowe objawy oraz co możesz zrobić, aby Twój czworonóg znów był zdrowy i wolny od pasożytów.

Spis treści

Chcesz przeczytać ten artykuł później? Pobierz artykuł w formacie PDF

Czym są roztocza grobowne?

roztocza grobowe *(Sarcoptes scabiei)* są mikroskopijnymi pasożytami skórnymi, które dosłownie wgryzają się pod skórę Twojego psa. W odróżnieniu od innych gatunków roztoczy nie żyją one na powierzchni skóry, lecz drążą maleńkie tunele w górnej warstwie skóry, gdzie składają jaja. Powstające w ten sposób produkty przemiany materii wywołują gwałtowną reakcję immunologiczną – objawiającą się silnym swędzeniem, stanami zapalnymi, a niekiedy krwawymi strupami.

Roztocza grobowce to:

- o wielkości 1–2 dziesiątych milimetra, niewidoczne gołym okiem
- wysoce zaraźliwa, zarówno wśród psów, jak i jako choroba odzwierzęca u ludzi
- niezwykle wytrwałe, ponieważ potrafią przetrwać w środowisku naturalnym przez kilka dni

Ważne: Chociaż nie stanowią zagrożenia dla życia, powodują znaczne cierpienie – zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.

W jaki sposób psy zarażają się roztoczami ziemnymi?

Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez bezpośredni kontakt skóry ze zakażonym zwierzęciem. Możliwe jest jednak również zakażenie pośrednie, na przykład poprzez wspólne legowiska, koce, szczotki lub sprzęt weterynaryjny.

Typowe źródła zakażenia:

- Kontakt ze zwierzętami bezpańskimi lub zaniedbanymi
- Psy ze schronisk lub z zagranicy, np. z Europy Południowej lub Wschodniej
- Plac zabaw dla psów lub hotele dla psów o niskim standardzie higieny
- Odchody lisów lub dzikich zwierząt (np. świerzb lisów na obszarach miejskich)

Okres inkubacji wynosi około 1–3 tygodni, w zależności od stanu odpornościowego psa. U niektórych psów objawy pojawiają się z opóźnieniem, co utrudnia rozpoznanie i opanowanie choroby.

Roztocza grobowce u psów: możliwość przenoszenia na ludzi (zoonoza/fałszywy świerzb)

Roztocza z rodzaju Sarcoptes mogą zaatakować nie tylko twojego psa, ale w rzadkich przypadkach mogą również przenosić się na ciebie. Mówi się wtedy o „pozornej świerzbie" lub „pseudo-świerzbie". Typowymi objawami są silnie swędzące obszary skóry, zaczerwienienia lub małe krostki. Nie martw się: roztocza z rodzaju Sarcoptes nie mogą trwale zaatakować człowieka, ponieważ nie jest on odpowiednim żywicielem. Zazwyczaj objawy ustępują samoistnie, gdy tylko pies zostanie poddany leczeniu, a bezpośredni kontakt zostanie ograniczony. Jeśli dolegliwości skórne u Ciebie utrzymują się dłużej, na wszelki wypadek powinieneś zgłosić się do dermatologa.

Objawy: jak wcześnie rozpoznać świerzb u psa

Typowy przebieg choroby rozpoczyna się od intensywnego swędzenia, zwłaszcza w miejscach, gdzie skóra jest ciepła lub gdzie jest mało sierści. Pierwsze objawy często pojawiają się na brzegach uszu, łokciach, brzuchu lub w okolicy klatki piersiowej.

Typowe objawy:

- Silne, nagłe swędzenie
- zaczerwienienie, łuszczenie się skóry i wypadanie włosów
- Zgrubiała skóra, miejscami pokryta żółtawymi strupami
- Niepokój, bezsenność i drażliwość
- W zaawansowanym stadium skóra może stać się twarda jak skóra, pojawiają się krwawe zadrapania oraz miejscami ropne stany zapalne.

Świerzb wywołany przez Sarcoptes u psa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarcoptes-Mange-Dog.JPG (Attribution-ShareAlike 3.0 Unported)

Odróżnienie od innych chorób skóry:

- Ukąszenia pcheł znajdują się zazwyczaj na tylnej części grzbietu lub u nasady ogona
- Roztocza z rodzaju Demodex powodują mniejsze swędzenie i zazwyczaj nie są zakaźne
- Alergie mają bardziej niejednoznaczny przebieg, często charakteryzujący się zmiennością

Wskazówka: Nawet jeśli sam nie widzisz roztoczy – w przypadku podejrzenia świerzbu zawsze należy skonsultować się z weterynarzem.

Lista kontrolna: Co zrobić, jeśli podejrzewasz, że pies ma roztocza?

Jeśli podejrzewasz, że Twój pies ma roztocza grobowate, powinieneś działać szybko. Najważniejszym krokiem jest zawsze wizyta u weterynarza, aby można było postawić pewną diagnozę – zazwyczaj na podstawie zeskrobiny skóry lub podobnych badań. Ponadto możesz samemu podjąć pewne działania, aby złagodzić dolegliwości u psa i zapobiec zarażeniu:

1. **Umówić się na wizytę u weterynarza** – w celu postawienia jednoznacznej diagnozy i rozpoczęcia leczenia.
2. **Ograniczyć kontakt z innymi zwierzętami**, aby roztocza nie rozprzestrzeniały się dalej.
3. **Kołderki, koszyczki i zabawki należy prać w wysokiej temperaturze**, aby środowisko pozostało wolne od roztoczy.
4. **Regularnie zmieniać miejsca do spania**, aby nie powstały gniazda roztoczy.
5. **Przycinanie pazurów**, aby zapobiec urazom spowodowanym drapaniem.
6. **Konsekwentne stosowanie terapii**, nawet jeśli swędzenie szybko ustępuje.
7. **Przeprowadzanie kontroli następczych**, aby upewnić się, że naprawdę wszystkie roztocza zniknęły.

W ten sposób pomożesz swojemu psu szybciej wrócić do zdrowia, a jednocześnie ochronisz inne zwierzęta w domu.

Diagnoza postawiona przez weterynarza

Jeśli zauważysz u swojego psa objawy, takie jak silne swędzenie, zmiany skórne lub wypadanie sierści, nie zwlekaj i udaj się do weterynarza. Tylko fachowe badanie pozwoli potwierdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z roztoczami świerzbowymi (Sarcoptes scabiei), czy też z inną chorobą.

Powszechnie stosowane metody diagnostyczne:

- **zeskrobina skóry**: Polega to na usunięciu fragmentu skóry za pomocą skalpela i zbadaniu go pod mikroskopem.
- **Preparat w postaci taśmy samoprzylepnej**: Jest to łagodniejsza alternatywa, szczególnie w przypadku skóry wrażliwej lub już zniszczonej.
- **Testy na obecność przeciwciał lub testy PCR**: Możliwe jako uzupełnienie, zwłaszcza w niejednoznacznych przypadkach.

Ale uwaga: Nie zawsze udaje się bezpośrednio wykryć roztocza. Zakopują się one głęboko i czasami trudno je wyłapać. Dlatego weterynarz często stawia diagnozę wstępną na podstawie objawów – i rozpoczyna tymczasowe leczenie, aby szybko przynieść ulgę zwierzęciu.

Jeśli stan Twojego psa znacznie się poprawi po kilku dniach, jest to wyraźna wskazówka na obecność roztoczy – nawet bez potwierdzenia mikroskopowego.

Leczenie roztoczy grobowych u psów

Po postawieniu diagnozy rozpoczyna się konsekwentne, trwające kilka tygodni leczenie. Jego celem jest wyeliminowanie roztoczy znajdujących się na skórze i w jej głębi, a jednocześnie złagodzenie swędzenia oraz zapobieganie infekcjom wtórnym.

Powszechnie stosowane metody zwalczania roztoczy grobowych

Leczenie roztoczy grobowych u psów ma na celu skuteczne wyeliminowanie pasożytów, a jednocześnie złagodzenie swędzenia oraz zapobieganie ewentualnym infekcjom wtórnym. W praktyce stosuje się przede wszystkim następujące środki:

- **Preparaty typu „spot-on" lub tabletki** zawierające substancje czynne, takie jak selamektyna, moksidektyna lub fluralaner. Działają one ogólnoustrojowo i zwalczają roztocza bezpośrednio.
- **Kąpiele lecznicze lub szampony**, np. amitrazem – jednak wyłącznie pod ścisłym nadzorem weterynarza, ponieważ środki te mają silne działanie.
- **Antybiotyki lub kortyzon**, jeśli występują już bakteryjne infekcje skóry lub rozległe stany zapalne.
- **Produkty łagodzące swędzenie**, które wspomagają dobre samopoczucie Twojego psa, dopóki skóra się nie zregeneruje.

W zależności od stosowanego środka konieczne jest wielokrotne stosowanie w odstępach 2–4 tygodni. Ważne jest, aby nie przerywać kuracji przedwcześnie – nawet jeśli swędzenie szybko ustępuje. Tylko w ten sposób masz pewność, że zabieg obejmie naprawdę wszystkie etapy rozwoju roztoczy.

Uwaga: Jeśli wynik badania psa na obecność roztoczy ziemnych jest pozytywny, należy zapobiegawczo poddać leczeniu również wszystkie zwierzęta z tego samego gospodarstwa domowego, które miały z nim kontakt – nawet jeśli nie wykazują jeszcze żadnych objawów.

Dodatkowo możesz ochrona przed owadami w postaci kropli na skórę stosować w celu ograniczenia ponownego kontaktu z ektopasożytami.

Domowe sposoby: środki wspomagające w walce z roztoczami grobowymi

Same domowe sposoby nie wystarczą, aby wyleczyć inwazję roztoczy – w tym celu zawsze konieczne jest konsekwentne leczenie weterynaryjne. Niemniej jednak możesz wspierać swojego psa, stosując łagodne środki w codziennym życiu.

Regularne pranie koców i legowiska, krótkie przycinanie pazurów oraz szampony nawilżające mogą pomóc złagodzić podrażnienia skóry i nieco zmniejszyć swędzenie. Również dodatki przyjazne dla skóry, takie jak olej kokosowy czy aloes, są przez wielu właścicieli zwierząt postrzegane jako przyjemne, jednak nie zastępują one leków przeciwko roztoczom z rodzaju Sarcoptes.

Zadbaj również o otoczenie – w ten sposób chronisz wszystkich domowników

Chociaż roztocza grobowce żyją głównie na ciele żywiciela, mogą przetrwać w otoczeniu nawet do 3 tygodni – zwłaszcza w kocach, dywanach lub tapicerce. Dlatego utrzymanie higieny otoczenia jest równie ważne jak leczenie farmakologiczne.

O tym warto pamiętać:

- Legowisko dla psa, koce i pluszaki należy prać codziennie, najlepiej w temperaturze 60 °C
- Dokładnie odkurzać dywany i meble tapicerowane – oraz regularnie je dezynfekować
- Regularnie zmieniaj miejsca do spania, aby nie tworzyły się gniazda roztoczy
- Wyczyść to samochód, jeśli twój pies regularnie tam jeździ

Ludzie mogą wprawdzie zarazić się tą chorobą (zoonoza), jednak infekcja ogranicza się zazwyczaj do wierzchniej warstwy skóry. Objawia się swędzącymi krostami lub wysypką. W przypadku utrzymujących się objawów należy zgłosić się do dermatologa.

Jak zapobiegać pojawianiu się roztoczy grobowych: czy to w ogóle możliwe?

W przypadku roztoczy grobowych należy pamiętać, że pojedyncze środki często nie wystarczają, aby całkowicie zapobiec zarażeniu – zwłaszcza jeśli Twój pies regularnie ma kontakt z innymi zwierzętami lub przebywa w środowiskach wysokiego ryzyka (np. hotele dla psów, zwierzęta ze schronisk, psy myśliwskie, psy z zagranicy).

Możesz jednak znacznie zmniejszyć to ryzyko, jeśli:

- unikać bliskiego kontaktu fizycznego z zarażonymi lub zaniedbanymi zwierzętami,
- przestrzegasz norm higienicznych dotyczących miejsc do spania i akcesoriów,
- regularnie sprawdzasz, czy u Twojego psa nie pojawiły się zmiany skórne,
- stosuje środki odstraszające, które powstrzymują pasożyty, takie jak roztocza, zanim się zadomowią.

Profilaktyka za pomocą preparatu typu „spot-on" na bazie składników naturalnych

Skuteczna ochrona nie musi opierać się na substancjach toksycznych: preparat Spot-On firmy Vetura wykorzystuje formułę na bazie składników roślinnych z sprawdzonym składnikiem aktywnym Saltidin®, *(Icaridin)*. Działa on odstraszająco, czyli zniechęca zapachem[1] – i dzięki temu zapobiega postrzeganiu psa przez pasożyty, takie jak roztocza ziemne, jako odpowiedniej ofiary.

Vetura® chroni nie tylko przed roztoczami ziemnymi, ale także przed:

- Kleszcze
- Pchły
- Wszy i wszy włosowe
- roztocza trawiaste, roztocza futrzane
- komary piaskowe oraz innych owadów żądlących

To sprawia, że jest to idealny wybór dla właścicieli psów, którzy chcą chronić swoich czworonogów przez cały rok, ale bez stosowania środków neurotoksycznych.

- Opracowane we współpracy z weterynarzami
- Nie zawiera środków owadobójczych
- Połączenie preparatu Saltidin® z olejami roślinnymi, takimi jak olej kokosowy, geraniowy i eukaliptusowy cytrynowy
- Wyprodukowano w Niemczech
- Łatwa aplikacja: co 2 tygodnie nanieść jedną kroplę na każde 2 kg masy ciała

Działanie ochronne pojawia się szybko i zapewnia Twojemu psu ochronę przed komarami piaskowymi, pchłami, roztoczami i kleszczami przez okres do 14 dni. Produkt jest przeznaczony dla wszystkich psów o masie ciała powyżej 2 kg i w wieku powyżej 3 miesięcy

Możesz bez ryzyka przetestować ten produkt dzięki naszej **60-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy**. Jeśli złożysz zamówienie przed godziną 15:00, zazwyczaj zostanie ono dostarczone już następnego dnia i będziesz mógł od razu skorzystać z produktu.

Oto dwie opinie zadowolonych klientów, którzy chętnie polecają ten środek przeciw kleszczom:

Wzmocnienie bariery ochronnej skóry: pielęgnacja w trakcie i po zabiegu

Oprócz właściwego leczenia farmakologicznego i stosowania środków odstraszających, takich jak preparat Spot-On firmy Vetura, skóra Twojego psa potrzebuje dodatkowej pielęgnacji.

Po zarażeniu roztoczami skórnymi skóra jest często podrażniona, łuszcząca się i wrażliwa. Szampony nawilżające lub łagodne balsamy pielęgnacyjne pomagają usunąć strupki i odbudować barierę ochronną skóry. Pomocna jest również dieta zawierająca wystarczającą ilość kwasy tłuszczowe omega-3 może wspomagać regenerację od wewnątrz.

Unikaj agresywnych środków pielęgnacyjnych i zbyt częstego kąpania, ponieważ powoduje to jedynie dalsze obciążenie skóry. Dzięki delikatnej pielęgnacji Twój pies szybciej poczuje się lepiej, a proces gojenia przebiegnie w optymalnych warunkach.

Wniosek: świerzb da się wyleczyć – przy odrobinie cierpliwości i konsekwencji

Roztocza u psów mogą być uciążliwe, uporczywe i zaraźliwe – ale można je skutecznie zwalczyć, jeśli zareagujesz szybko i systematycznie. Kluczowe znaczenie ma połączenie następujących czynników:

- wcześniejsza diagnoza weterynaryjna,
- konsekwentnego leczenia,
- dokładne sprzątanie otoczenia
- oraz długoterminowego zapobiegania nowym zakażeniom.

Delikatna, ale skuteczna ochrona, taka jak Vetura® Spot-On, pomoże Ci chronić Twojego psa przed pasożytami – całkowicie bez stosowania substancji neurotoksycznych. Dzięki temu Twój czworonóg będzie nie tylko wolny od roztoczy, ale także dobrze chroniony przed pchłami, kleszczami i innymi uciążliwymi szkodnikami.

Vetura Spot-On z Saltidin® oraz olejami roślinnymi – delikatna, skuteczna ochrona na co dzień.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące roztoczy grobowych u psów

- Jak długo trwa terapia? +
- Czy świerzb powraca? +
- Czy świerzb jest niebezpieczny? +
- Jakie objawy są typowe dla roztoczy grobowych? +

Vetura – środek przeciw kleszczom dla psów dzięki formule opartej na składnikach naturalnych zapewnia skuteczną ochronę.

O produkcie →

W magazynie: w **3-4** dni robocze u ciebie

Źródła i badania naukowe +

©2026 Vetura GmbH

Teksty na grafikach zostały przetłumaczone z języka niemieckiego z wykorzystaniem narzędzi AI, a następnie zredagowane i sprawdzone przez native speakera języka polskiego. Treść merytoryczna pozostała niezmieniona.

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych wskazówek i zostały starannie opracowane na podstawie dostępnych źródeł. Autorzy oraz operatorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne ani niematerialne powstałe w wyniku korzystania z przedstawionych informacji lub zaniechania korzystania z nich, jak również w wyniku wykorzystania informacji błędnych lub niekompletnych. Przedstawione tutaj produkty nie są lekami, lecz suplementami diety dla zwierząt lub produktami pielęgnacyjnymi. W związku z tym nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, łagodzenia ani zapobiegania chorobom. Nie zastępują również porady lekarza weterynarii ani leków przepisanych przez lekarza weterynarii. W razie wątpliwości przed zastosowaniem produktu należy zawsze skonsultować się z lekarzem weterynarii.