
Zapalenie po ukąszeniu kleszcza u psa: porady weterynarki

Vetura | Dr. Sue Ertl • Ostatnia aktualizacja: 29. października 2025



Dr. Sue Ertl

Artykuł ten powstał we współpracy z lekarką weterynarii dr Sue Ertl. Od 20 lat prowadzi ona własną praktykę weterynaryjną specjalizującą się w małych zwierzętach w pobliżu Monachium i w Alpach. Jej pasją jest edukowanie właścicieli zwierząt na temat zdrowia.

Udostępnij wpis

Ugryzienie przez kleszcza nie jest dla wielu właścicieli psów niczym nieznanym – zwłaszcza w ciepłszych miesiącach. Co jednak zrobić, jeśli miejsce ukąszenia nagle zaczerwieni się, spuchnie, a nawet zaczyna ropieć? Zapalenie w miejscu ukąszenia kleszcza może wskazywać na infekcję lub reakcję alergiczną, a w niektórych przypadkach może nawet być objawem niebezpiecznej choroby, takiej jak na: borelioza lub anaplazmoza psa.

Szybka reakcja ma kluczowe znaczenie, aby uniknąć powikłań i zoszczędzić psu niepotrzebnego bólu. Jak jednak odróżnić niegroźną reakcję skórną od poważniejszego zapalenia? I kiedy domowe sposoby lub leki naprawdę pomagają?

Zobaczmy razem, jak możesz pomóc swojemu psu w przypadku zapalenia – i co możesz zrobić, aby uniknąć takich problemów w przyszłości.

Spis treści

Chcesz przeczytać ten artykuł później?

Pobierz artykuł w formacie PDF

Dlaczego ukąszenie kleszcza u psa może spowodować stan zapalny?

Ukąszenie kleszcza zazwyczaj nie stanowi większego problemu – o ile kleszcz zostanie prawidłowo usunięty, a miejsce ukąszenia pozostanie czyste. Niemniej jednak w niektórych przypadkach może dojść do stanu zapalnego.

Możliwe przyczyny zapalenia

- **Zakażenie bakteryjne**
  - podczas ssania kleszcz może przenosić bakterie do rany.
- **Reakcja na ciało obce**
  - układ odpornościowy psa może reagować na ślinę kleszcza, co prowadzi do miejscowego stanu zapalnego z obrzękiem i swędzeniem.
  - Niektóre psy mają skłonność do nadmiernych reakcji skórnych, które nawet bez infekcji mogą wyglądać niepokojąco.
- **Niekompletnie usunięcie kleszcza**
  - Jeśli głowa lub aparat gębowy kleszcza utkwią w skórze, rana może ulec zakażeniu.
  - Tkanka reaguje zaczerwienieniem, obrzękiem i tworzeniem się ropy.
- **Drapanie i lizanie przez psa**
  - swędzenie po ukąszeniu kleszcza jest zjawiskiem normalnym, ale nadmierne lizanie lub drapanie może spowodować przedostanie się bakterii do rany.
  - W ten sposób zrydza dodatkowo może przyrodzić się w powstałą infekcję.
- **Przenoszenie chorób**
  - Niektóre gatunki kleszczy przenoszą czynniki chorobotwórcze, takie jak bakterie Borrelioza, anaplazmozy kenaplazmozy, ehrlichioz (Ehrlichiosis), babeszjozy lub wirusy wiosenno-letniego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (kleszczowe zapalenie mózgu).
  - Objawy miejscowego stanu zapalnego mogą również wystąpić gorączka, kulawizna lub letarg.

Nie każde zaczerwienie w miejscu ukąszenia przez kleszcza oznacza zakażenie, ale każde zapalenie należy obserwować i w razie potrzeby leczyć.

Jak rozpoznać stan zapalny po ukąszeniu przez kleszcza?

Zapalenie reakcja na ukąszenie kleszcza wyraźnie różni się od zwykłej reakcji skórnej po: usuwanie kleszcza. Ale po czym można rozpoznać, czy przyczyną jest choroba, czy infekcja?

Typowa reakcja po ukąszeniu przez kleszcza

- Lekkie zaczerwienienie i obrzęk w ciągu pierwszych 24 godzin.
- Niewielka drapka lub minimalne swędzenie, które ustępuje po kilku dniach.
- Brak ropy ani tworzącej się rany.

Takie reakcje są nieszkodliwe i zazwyczaj ustępują samoistnie.

Objawy zapalenia lub infekcji

Silne zaczerwienienie i obrzęk, obszar wokół ugryzienia pozostaje zaczerwieniony i gorący przez kilka dni. Obrzęk ustępuje wolniej zamiast zmniejszyć.

Nagromadzenie ropy lub sączenie rany Z miejsca ukąszenia wydobywa się żółtawa lub zielonkawa ropa. Wilgotna, sącząca się skóra może być oznaką infekcji bakteryjnej.

Swędzenie i ból psu nasuwanie drapie lub liże to miejsce. Po dotknięciu rany psu wykazuje oznaki ciągu samopoczucia lub reakcje bólowe.

Twarde guzki lub wrzody U niektórych psów w miejscu ugryzienia pojawia się niewielki, twardy guzek. Jeśli objaw ten nie ustąpi w ciągu 3 tygodni, należy udać się do weterynarza w celu zbadania sprawy.

Ogólne objawy choroby Gorączka lub osłabienie Utrata apetytu Kulawizna lub sztywny chód (możliwe objawy boreliozy lub anaplazmozy).

Jeśli wystąpi jeden lub więcej z tych objawów, należy podjąć odpowiednie działania – ponieważ nieleczona infekcja może się rozprzestrzeniać.

Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia po ukąszeniu kleszcza – co robić?

Jeśli zauważysz stan zapalny w miejscu ukąszenia przez kleszcza, możesz od razu podjąć pewne działania, aby przyspieszyć gojenie.



Jak prawidłowo usunąć resztki kleszcza

Jeśli jakakolwiek część kleszcza pozostała w skórze, należy ją ostrożnie usunąć pęsetą lub usuwanie do kleszczy, należy je usunąć. Jednak jeśli battym pozostanie nie należy próbować wyciągać resztek za pomocą oleju, alkoholu ani innych domowych środków – może to nasilić stan zapalny.



Oczyszczanie ran i dezynfekcja

Dezynfekcją miejsce ukąszenia łagodnym środkiem antyseptycznym np. kwasem podchlorynowym lub roztworem nadtlenku wodoru (3%). Alternatywnie, w uzupełnieniu skóry mogą pomóc również naturalne środki domowe, takie jak herbata rumiankowa lub roztworzona nalewka z nagietka.



Wspomaganie gojenia się ran

Jeśli psu intensywnie drapie lub liże rana, do jej ochrony może pomóc miękki kołnierz ochronny lub ubranie. Jako domowe środki można zastosować chłodzący żel z aloesu lub sprzęt przeciwzapalne, aby złagodzić podrażnienie skóry.

Jeśli objawy nie ustępują w ciągu 1–2 dni lub się nasilą, należy udać się do weterynarza!

Kiedy powinieneś zabrać psa do weterynarza?

W wielu przypadkach możesz samodzielnie wyleczyć lekko zapalone ukąszenie kleszcza. Kiedy jednak sytuacja staje się poważna? Niektóre objawy wymagają szybkiej wizyty u weterynarza, aby zapobiec powikłaniom lub poważnym infekcjom.

Oznaki wymagające wizyty u weterynarza

Silne zaczerwienienie i narastający obrzęk Jeśli obszar zapalenia przekracza (z 3 cm lub będzie się dalej rozprzestrzeniał. Jeśli skóra jest gorąca, twarda lub bardzo wrażliwa na dotyk.

Rana z ropą lub sączącą się raną Jeśli z miejsca ukąszenia wydobywa się ropa, jest to oznaka infekcji bakteryjnej. Wilgotna, podrażniona skóra może wskazywać na wtórną infekcję.

Zwiększona temperatura lub stan objawy ogólne Gdy pies wykazuje gorączkę, Przeniesione wyżej objawów – objaw rozprzestrzeniającej się infekcji. Jeśli psu zaczyna kuleć, chodzić chwiejnie lub wykazywać niezwykłe zachowanie, może to wskazywać na infekcję ogólnoustrojową, taką jak borelioza lub anaplazmoza.

Jeśli wyżej te objawy nie zwlekaj – szybkie leczenie może zapobiec poważnym powikłaniom!

Możliwości leczenia u weterynarza

Jeśli miejsce ukąszenia kleszcza, w którym wystąpiło zapalenie, nie goi się samoistnie lub stan się pogarsza, weterynarz rozpocznie ukierunkowane leczenie, aby powstrzymać infekcję i przywrócić zgojenie.

Badania i diagnoza

- **Badanie fizykalne:** Weterynarz bada miejsce ukąszenia, sprawdza wzrzty chorobę i temperaturę ciała.
- **Badanie krwi:** W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej konieczne może być wykonanie morfologii krwi oraz badania na obecność przeciwciał (np. w kierunku boreliozy lub anaplazmozy).
- **Wymaz z rany:** W przypadku obecności ropy lub silnego stanu zapalnego można pobrać próbkę w celu zidentyfikowania bakterii.

Leki i opatrunki

Antybiotyki (w przypadku zakażeń bakteryjnych)
W przypadku wystąpienia infekcji zarzycia przepisuje się antybiotyk o szerokim spektrum działania np. amoksycylinę lub klindamycynę.

Wskazówka: W trakcie i po kuracji antybiotykowej wzórw jest, aby przywrócenie florę jelitowej aby uniknąć problemów trawiennych.

Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe
Jeśli rana jest mocno zapalna, pomocny może być środek przeciwzapalny (NSAID).

Oczyszczanie ran i zabiegi antyseptyczne
weterynarz może przeprowadzić profesjonalne oczyszczenie i dezynfekcję rany.
W przypadku poważnego zia rozmia lub wrzodu może być konieczny niewielki zabieg chirurgiczny.

Czas trwania leczenia

- W przypadku łagodnego zapalenia – 5–7 dni pielęgnacji rany w domu.
- W przypadku zakażenia bakteryjnego: antybiotyki przez 7–14 dni.
- W przypadku ciężkich infekcji: wieloty pełnienie spieka przyszpitalne obejmująca badania krwi i obrzęk.

Im wcześniej rozpoczniesz się leczenie, tym krótszy będzie czas rekonwalescencji i tym niższe będą koszty!

Jak mogę w przyszłości zapobiegać stanom zapalnym po ukąszeniach kleszczy?

Najlepszym sposobem zapobiegania stanom zapalnym i infekcjom jest skuteczna ochrona przed kleszczami oraz szybkie usuwanie kleszczy.

Regularna kontrola i szybkie usuwanie

Najlepsza profilaktyka zaczyna się od regularnych kontroli po spacerach:

- Po każdym spacerze dokładnie sprawdź zwrot psa! Igłam obecności kleszczy.
- kleszcze należy natychmiast usunąć za pomocą specjalnej szczypcy do kleszczy, usunąć.
- Następnie zdezynfekować miejsce ukąszenia i obserwować je przez kilka dni.

Im szybciej usuniesz się kleszcza, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia!

Odpowiednia ochrona przed kleszczami: środki chemiczne a środki naturalne

Istnieją chemiczne środki przeciw kleszczom, które je zabijają lub zapobiegają ich pojawieniu się:

Preparaty typu spot-on (np. pomocą, Permethrina, Fipronil lub Bursztynit)
Krople, które nakłada się bezpośrednio na skórę. W zależności od substancji czynnej zapewniają ochronę przez okres od 4 tygodni do 3 miesięcy.

Obroże przeciw kleszczom (np. na pomocą Bravecto lub Imidakloprzyd)
Działają poprzez wydzielanie substancji, które zabijają kleszcze, zanim ugryzą.

Tabletkam (np. na pomocą, Afoxolaner)
Działają one w ten sposób, że substancja czynna przedostaje się do krwi psa i jest wchłaniana przez kleszcza podczas ssania krwi.

Możliwe wady:
❌ mogą powodować działania niepożądane, takie jak podrażnienia skóry lub zaburzenia trawienia.
❌ Nie nadaje się dla wszystkich psów np. dla psów ciężarnych na padaczkę lub wrażliwych zwierząt.

Wskazówka: Jeśli szukasz alternatywy bez substancji chemicznych, dobrym wyborem będzie naturalny środek chroniący przed kleszczami.


Ochrona przed kleszczami oparta na składnikach naturalnych: skuteczna alternatywa

Wielu właścicieli psów szuka skutecznych środków, które odstraszają kleszcze bez stosowania substancji neurotoksycznych.

Jakie substancje czynne pomagają w walce z kleszczami?

✅ Olej kokosowy: Zawiera kwas laurynowy, który odstrasza kleszcze.
✅ cytronel oraz olejek z eukaliptusa cytrynowego: olejki eferyczne o działaniu odstraszającym kleszcze.
✅ Sudafed: Sprawdzony składnik aktywny w wysokim stopniu ochrony – bez substancji neurotoksycznych. Stosowany jest na przykład również u dzieci lub kobiet karmiących piersią.

Nasz ochrona przed kleszczami oparta na naturalnych składnikach liczy w sobie wiele rośliny i Sudafed – to bezpieczna i skuteczna alternatywa!




Środek chroniący przed kleszczami jest przeznaczony dla wszystkich psów o masie ciała powyżej 2 kg i w wieku powyżej 3 miesięcy. Działanie pojawia się w ciągu 1–2 dni od pierwszego zastosowania.

Stosowanie:
Nałóż jedną kroplę na każde 2 kg masy ciała psa na skórę w okolicy karku.
Aby uzyskać ochronę, należy powtarzać tę czynność co dwa tygodnie oraz po kontakcie z wodą.

Możesz bez ryzyka przetestować ten produkt dzięki naszej **60-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy**. Jeśli złożysz zamówienie przed godziną 16:00, zarzycyzą zostanie ono dostarczone już następnego dnia i bezpłatnej mogli od nasz obecnych z produktu.

Oto dwa opinie zadowolonych klientów, którzy chętnie polecają ten środek przeciw kleszczom:



Podsumowanie

Zaniedbane miejsce ukąszenia kleszcza może być bolesne dla Twojego psa, a w poważniejszych przypadkach może prowadzić do poważnej infekcji. Chociaż niewielkie zaczerwienienie na często nieszkodliwe, bakteryjne zapalenie może powodować ropienie, ból, a nawet gorączkę. Wczesna postępująca rany i odpowiednie leczenie pomagają uniknąć powikłań.

Najlepszą jednak od samego początku zapobiegać ukąszeniom kleszczy. Niezawodna ochrona przed kleszczami to najlepsza strategia zapobiegania zarażeniu chorobą zakaźną, infekcji i chorób przenoszonych przez kleszcze. Środki takie jak Sudafed czy olejki eferyczne zapewniają bezpieczną i skuteczną alternatywę dla produktów zawierających trucizny paraliżujące układ nerwowy.

Źródła i badania naukowe

Links oznaczone gwiazdką (*) to linki partnerskie prowadzące do ofert sklepowych. Jeśli klikniesz na taki link i dokonasz zakupu, to jego przedsiębiorstwo otrzymamy prowizję od sprzedaży. Nie wpływa to jednak na cenę, ilość dodatki.

Wiedza na produktu zawarte na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie zastępują one porady lekarza weterynarii ani diagnozy. Przed rozpoczęciem stosowania suplementu diety lub zmianą diety psa skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych wskazówek i zostały stworzone sprzeczne ze podstawie dostępnych źródeł. Autorzy oraz operatorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania tych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, opuszczenia lub nieścisłości, jak również za wyniki wykorzystywania informacji zawartych na tej stronie. Nie gwarantujemy, że informacje te są kompletne, aktualne lub odpowiednie do konkretnego celu użytkownika. Korzystanie z informacji zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Informacje zawarte na tej stronie nie zastępują porady lekarskiej, diagnozy ani leczenia. Przed podjęciem jakichkolwiek działań dotyczących zdrowia swojego psa należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie bez konsultacji z lekarzem weterynarii.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść, fotografie i grafiki na tej stronie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.